



RÁPIDO y SOSTENIDO

ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS ^{5,6}

- Rápida neutralización del pH gástrico; >4 en los primeros 15 minutos. ^{*5,7}
- Supresión del ácido gástrico. ⁵
- Control del reflujo Gastroesofágico nocturno. ⁵

INHIBITRON ^{Twit}40
Omeprazol / Bicarbonato de sodio



RÁPIDO y SOSTENIDO
control de la acidez intragástrica. ⁵

Referencias:
1. Young A *et al.* GERD: A practical approach. Clin J Med Cleveland. 2020;87(4):223-30. **2.** Walker, D *et al.* Challenges of Correlating pH Change with Relief of Clinical Symptoms in Gastro Esophageal Reflux Disease: A Phase III, Randomized Study of Zegerid versus Losec. PLoS One. 2015 Feb; 23(10(2)):e0116308. **3.** Fass R *et al.* Omeprazole 40 mg once a day is equally effective as lansoprazole 30 mg twice a day in symptom control of patients with gastro-oesophageal reflux disease (GERD) who are resistant to conventional-dose lansoprazole therapy: Da prospective, randomized, multi-centre study. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 1595-31603. **4.** Orbelo DM *et al.* Once-Daily Omeprazole/Sodium Bicarbonate Heals Severe Refractory Reflux Esophagitis with Morning or Nighttime Dosing. Dig Dis Sci. 2015 Jan;60(1):146-62. **5.** Higuera de la Tijera F. Efficacy of omeprazole/sodium bicarbonate treatment in gastroesophageal reflux disease: a systematic review. Medwave. 2018;18(2):e7179. **6.** Inhibitron Twit 40. Información para prescribir. Liomont. **7.** Katz PO, Koch FK, Ballard ED *et al.* Comparison of the effects of immediate-release omeprazole oral suspension, delayed-release lansoprazole capsules and delayed-release esomeprazole capsules on nocturnal gastric acidity after bed time dosing in patients with night-time GERD symptoms. Aliment Pharmacol Ther 2007;25(2):197-205.

*En comparación con la absorción obtenida con tabletas de liberación retardada.
 Inhibitron Twit 40® Reg. Núm.: 049M2022 SSA IV, Inhibitron Twit® Reg. Núm.: 144M2015 SSA VI, Inhibitron® F Reg. Núm.: 318M2004 SSA IV, Inhibitron® Solución Reg. Núm.: 539M2001 SSA IV, Inhibitron® Reg. Núm.: 277M91 SSA VI


Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@liomont.com.mx o en la página de internet: www.liomont.com.mx

Clave de almacén: 8625034

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONAL DE LA SALUD



EVIDENCIA CIENTÍFICA



El manejo actual de los síntomas de la esofagitis

La combinación de

Omeprazol
40mg



Bicarbonato
de sodio

INHIBITRON ^{Twit}40
Omeprazol / Bicarbonato de sodio


Los síntomas típicos de la esofagitis son el reflujo y la acidez gástrica.¹

Los síntomas de la esofagitis empeoran en decúbito, especialmente después de las comidas.¹

La disfagia es un síntoma de esofagitis no complicada y su presencia justifica un examen más intensivo y una posible intervención.¹

El dolor torácico a menudo se asocia con la esofagitis y se debe descartar una causa cardíaca antes que esofagitis.¹

Tratamiento de la esofagitis por reflujo gastroesofágico.¹



IBP: INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES; EGD: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

El tratamiento inicial para los pacientes con acidez gástrica no complicada es la terapia con IBP o antagonistas de los receptores de histamina 2 (H₂RA).²


Modificar el estilo de vida, incluido el manejo del sobrepeso/obesidad y evitar alimentos específicos, mejoran los resultados del tratamiento.²

La terapia a demanda con IBP proporciona un tratamiento económico, conveniente y exitoso.²

El estudio de *Fass et al.*, demostró que, en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), **omeprazol 40 mg una vez al día controló los síntomas.**³

El uso de una dosis de 40 mg de omeprazol una vez al día puede ser clínicamente más efectivo debido a que el paciente se adhiere mejor al tratamiento.³

La mejora en el grupo de omeprazol fue consistentemente mayor que en el grupo de lansoprazol.³



Mejoría en los síntomas de acidez estomacal diurna (A), acidez estomacal nocturna (B) y regurgitación ácida (C) durante las 6 semanas del estudio.³

El uso de un análisis de regresión de series temporales reveló una mejoría de los síntomas más alta con omeprazol vs. lansoprazol.³

La eficacia de la combinación de omeprazol 40 mg/bicarbonato de sodio se demostró en un estudio de 8 semanas en la Clínica Mayo, donde el 88% de los pacientes curaron o mejoraron las erosiones de la mucosa.⁴

La rápida neutralización del ácido gástrico por el bicarbonato de sodio acelera la absorción del omeprazol.⁵